

Ficha Técnica

Balanka
70DG

Nombre comercial: BALANKA 70DG

Tipo: Insecticida

Formulación: Gránulos Dispersables

Grupo Químico: Tiadiazinas

Ingrediente activo: Buprofezin

Nombre químico: (Z)2-tert-butilimino-3-isopropil-5-fenil-1,3,5-triadiazinan-4-ona.

Concentración (p/p): 70%

Modo y Mecanismo de acción:

BALANKA 70DG es un insecticida de contacto e ingestión, regulador de crecimiento que inhibe la biosíntesis de quitina, Tipo 1 de Homópteros en estados ninfales o inmaduro, evitando el proceso de muda. En adultos suprime la ovoposición y reduce la viabilidad de huevecillos. La proteína responsable de la actividad biológica es desconocida o no está caracterizada

Categoría Toxicológica (Registro COFEPRIS): 4 Precaución.

“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	RECOMENDACIONES
Papayo (3)	Mosquita Blanca <i>Trialeurodes variabilis</i>	0.5 – 1.25 Kg/ha	Realizar una aspersión al follaje
Vid (7)	Piojo harinoso de la vid <i>Planococcus ficus</i>	1.0 – 1.25 Kg/ha	Realizar una aplicación a toda la planta; volumen de aplicación 2000 L/ha. Para asegurar un adecuado control es necesario adicionar a la mezcla un coadyuvante no iónico

Periodo de reentrada a las áreas tratadas:

() **Intervalo de seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. Llenar el tanque de aplicación hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad, agregar el producto, completar hasta su capacidad y mantener en constante agitación para que el producto se mezcle completamente dentro del tanque. La aplicación debe hacerse inmediatamente después de que la solución de rociado esté preparada. Es muy importante asegurar una buena cobertura al momento de la aplicación, para un control más efectivo. Las aplicaciones pueden hacerse con el equipo de volumen de alta o baja aspersión que proporciona una cobertura completa de la planta. Para obtener los mejores resultados, aplique cuando las poblaciones de plagas están empezando a desarrollarse antes de llegar a los límites de tolerancia.

CONTRAINDICACIONES. No se aplique en cultivos para los que no tiene recomendación de uso en esta etiqueta, no aplicar cuando existe posibilidad de lluvia que pueda provocar el lavado del producto. No permita que la aspersión sea desviada a cultivos vecinos, evitando aplicar cuando exista velocidad del viento mayor a 10 km/hora o con temperaturas elevadas. Evite aplicar bajo condiciones de sequía extrema o en cultivos estresados por sequía.

INCOMPATIBILIDAD. BALANKA 70DG, es compatible con Imidan 50% WP.

FITOTOXICIDAD. Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

“MANEJO DE RESISTENCIA”. “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.”

No. de Registro: RSCO-INAC-0198-0404-034-70

Envase: Frascos de 1 kg