

Ficha Técnica

Savey 50 GD

Acaricida / Ovicida

Nombre comercial:	SAVEY 50 GD
Tipo:	Acaricida
Formulación:	Gránulos Dispersables.
Grupo Químico:	Carboxamidas
Ingrediente activo:	Hexitiazox
Nombre químico:	(4RS,5RS)-5-(4-clorofenil)-N-ciclohexil-4-metil-2-oxotiazolidina-3-carboxamida
Concentración (p/p):	50% Equivalente a 500 g.i.a/kg
Modo y Mecanismo de acción:	SAVEY 50 GD es un acaricida-ovicida para el control de araña roja, con acción de contacto directo del producto con la plaga o contacto residual con la superficie tratada. Interrumpe el ciclo biológico del ácaro al inhibir la eclosión en la etapa de huevecillo y las mudas de los estadios de larvas y ninfas por inhibición de la síntesis de quitina. Afecta también la capacidad reproductiva de hembras adultas al fomentar la ovipostura de huevecillos no viables.
Categoría Toxicológica:	4 Precaución.

“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Fresa, Zarzamora Frambuesa Grosella (3)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	300 a 400 g/ha
Crisantemo, Rosal, Gerbera, Clavel (S/L)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	15 a 20 g en 100 l de agua
Manzano, Membrillo Peral y Tejocote (28)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	250 a 300 g/ha
Observaciones: Realizar una aplicación al follaje al momento que aparezcan los primeros individuos. Emplear la dosis mayor cuando exista una alta infestación de la plaga. Si existe poblaciones de adultos en niveles de infestación de media o alta, o si todos los estadios de la plaga están presentes, aplicar antes o después o en combinación con un acaricida de contacto que controle adultos. Hacer solo una aplicación por ciclo o temporada de cultivo.		

() **Intervalo de seguridad en días:** Días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

S/L: Sin Límite.

Tiempo de reentrada a áreas tratadas: 12 h después de la aplicación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Para abrir el envase, abra la tapa de rosca y retire el sello de seguridad. Poner en el tanque la mitad del agua a usar. Adicionar la cantidad de **SAVEY 50 GD** adecuada. Adicionar la cantidad de agua faltante. Mantener el equipo en agitación durante el llenado y la aplicación para una buena dilución del producto.

Para los casos de fresa, zarzamora, frambuesa y grosella, calibrar el equipo para aplicar un volumen de agua de 600 L/Ha. Para el caso de crisantemo, rosal, gerbera y clavel calibrar el equipo para aplicar un volumen de agua de 2000 l/Ha. Para el caso de manzano, tejocote, membrillo y peral calibrar el equipo para aplicar un volumen de 280 a 380 L/Ha en huertas jóvenes en crecimiento y 800 a 1000 L/Ha en huertas maduras en plena producción.

Al asperjar el producto se debe cubrir completamente el follaje de la planta tanto el haz como el envés.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar cuando la velocidad del viento sea mayor de 15 km/h. No aplicar **SAVEY 50 GD** en sistemas de riego presurizado.

FITOTOXICIDAD

SAVEY 50 GD no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

SAVEY 50 GD, es compatible con la mayoría de agroquímicos en los cultivos aquí recomendados, sin embargo, todas las posibles mezclas no han sido evaluado evaluadas, por ello, antes de realizar una mezcla en campo y asperjar al cultivo, se recomienda realizar una pequeña prueba previa. Por ello, GOWAN MEXICANA S.A.P.I. DE C.V. no asume la responsabilidad de las mezclas que se realicen con productos que no estén citados específicamente en esta etiqueta. En caso de dudas, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, para observar los aspectos físicos de la mezcla y reacciones sobre las plantas tratadas. En caso de ser necesario hacer una mezcla, esta deberá realizarse con productos registrados y autorizados para los cultivos aquí indicados.

“MANEJO DE RESISTENCIA”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL. SE RECOMIENDA APLICAR **SAVEY 50 GD** UNA VEZ POR CICLO O TEMPORADA DE CULTIVO. NO APLICAR EN ROTACIÓN CON ACARICIDAS CON EFECTO OVICIDA. EN EL CASO DE REQUERIR APLICACIONES ADICIONALES USAR UN ACARICIDA CON EFECTO ADULTICIDA CON DIFERENTE MECANISMO DE ACCIÓN”.

Proveedor: Gowan Company LLC.

No. De registro: RSCO-INAC-0102R-303-034-050

Envase: Botes con 340 gr
Botes con 70 gramos