



CapsiAlil®

Gowan®
MEXICO

FICHA TÉCNICA

Este documento es únicamente de carácter informativo y exclusivo para su publicación electrónica

NOMBRE COMERCIAL:	CAPSIALIL
TIPO:	Insecticida y/o Acaricida
FORMULACIÓN:	Concentrado Emulsionable
GRUPO QUÍMICO:	Capsaicinoides + Organosulfurados (Tiosulfatos)
INGREDIENTE ACTIVO:	Extracto de ajo + Extracto de chile
NOMBRE QUÍMICO:	Extracto de ajo (<i>Allium sativum</i>) + Extracto de chile (<i>Capsicum sp</i>)
CONCENTRACIÓN (p/p):	Extracto de Ajo 23.4% + Extracto de chile 7.6%
MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:	Es un insecticida y/o acaricida botánico a base de extractos de ajo y chile, que actúa principalmente por repelencia, irritación y trastornos digestivos en los insectos.
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA (REGISTRO COFEPRIS):	Categoría Toxicológica: 5 PRECAUCIÓN

**“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”****“INSTRUCCIONES DE USO”****“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/Ha	OBSERVACIONES
Arandano, Frambuesa, Fresa, Grosella y Zarzamora, (0)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.0 - 2.0	Realizar 4 aplicaciones al follaje, a intervalos de 5 días. Agregar a la mezcla un coadyuvante a razón de 1.0 mL/L de agua. Calibre para usar un volumen de aplicación de 350 – 450 L de agua/ha.
Berenjena, Chile, Jitomate, Papa, Tomate de cáscara. (0)	Paratrioza (<i>Bactericera cockerelli</i>)	1.0 - 2.0	Realizar 3 aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 días. Agregar a la mezcla un coadyuvante a razón de 1.0 mL/L de agua. Calibre para usar un volumen de aplicación de 430 – 430 L de agua/ha.
Ajo, cebolla, cebollín. (0)	Trips (<i>Thrips tabaci</i>) Minador de la hoja (<i>Lyriomyza trifoli</i>)	0.5 – 1.5	Realizar 4 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 350-450 L de agua/ha.
Aguacate (0)	Ácaro cristalino (<i>Oligonychus perseae</i>) Ácaro café (<i>Oligonychus punicae</i>) Trips (<i>Frakliniella occidentalis</i>)	0.5 – 1.5	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten las primeras ninfas y adultos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 950-1050 L de agua/ha.
Arándano, Frambuesa, Fresa, Grosella, Kiwi, Vid, Zarzamora (0)	Piojo harinoso (<i>Planococcus ficus</i>)	0.5 – 1.5	Realizar 3 aplicaciones a intervalo de 7 días, al detectar los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 600 – 1000 L de agua/ha.
Piña (0)	Barrenador del fruto (<i>Techla basilides</i>)	1.0 – 2.0	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días. Iniciar al detectar los primeros individuos. Agregar a la mezcla de tanque un coadyuvante no iónico de tipo surfactante, humectante, dispersante y penetrante a dosis recomendada en su etiqueta. Volumen de aplicación sugerido 300 – 400 L de agua/ha.
Agave (0)	Escama armada (<i>Acutaspis agavis</i>)	0.5 – 1.5	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, al detectar los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 300 – 400 L de agua/ha.



CapsiAlil

Gowan
MEXICO

() **Intervalo de seguridad:** Número de días entre la última aplicación y la recolección o cosecha del cultivo.

SL = Sin Límite

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 4 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Use el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, mascarilla para polvos o vapores, careta protectora, guantes y botas de hule. Agite bien el envase antes de abrirlo. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca, girándola en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Retire el sello de seguridad del envase.

Para mayor precisión mida la cantidad de producto a utilizar con una probeta graduada. Usar la dosis baja en forma preventiva o cuando haya baja presión de la plaga. Usar la dosis media o alta cuando aumente la presión de la plaga.

Llene el tanque a la mitad de su capacidad total, agregue la cantidad necesaria de **CAPSIALIL**, complemente con agua hasta el nivel deseado y mantenga la mezcla en constante agitación durante su preparación y aplicación.

Para una mejor eficacia del producto, mantenga un pH de la solución alrededor de 5.6.

Durante la aplicación de la mezcla, asegure una cobertura completa y uniforme tanto del haz como del envés de las hojas.

CONTRAINDICACIONES

Aplique por la mañana temprano, cuando la temperatura sea baja. No aplique en horas de calor intenso. No aplique cuando el viento sea mayor de 8 km/h, ni cuando exista una alta probabilidad de lluvia dentro de las próximas 3 horas. No almacenar la mezcla preparada, aplíquese el mismo día de la preparación.

FITOTOXICIDAD

CAPSIALIL no es fitotóxico en las dosis y cultivos aquí recomendados.

INCOMPATIBILIDAD

NO se recomienda **CAPSIALIL** en mezcla de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”.



CapsiAlil®

Gowan®
MEXICO

NO. DE REGISTRO: RSCO-MEZC-INAC-1108A-X0026-009-031

PRESENTACIÓN: 500 mL y 1 L

Gowan Mexicana S.A.P.I de C.V

Calzada Cety's # 2799, Edificio B, Local 2 y 4. Colonia Rivera, Mexicali, B.C. Teléfono (686)5 64 75 00

www.gowanmexicana.com