

## FICHA TÉCNICA

Este documento es únicamente de carácter informativo y exclusivo para su publicación electrónica

<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>	MONCEREN 250 SC
<b>TIPO:</b>	Fungicida
<b>FORMULACIÓN:</b>	Suspensión concentrada
<b>GRUPO QUÍMICO:</b>	Fenil urea
<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	Pencycuron
<b>NOMBRE QUÍMICO:</b>	1-(4-clorobenzil)-1-ciclopentil-3-fenilurea
<b>CONCENTRACIÓN (p/p):</b>	22.9% (Equivalente a 250 g I.A./L)
<b>MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:</b>	<b>MONCEREN 250 SC</b> es un fungicida que pertenece a la familia de las fenil ureas, tiene actividad específica contra el patógeno <i>Rhizoctonia solani</i> Inhibe parte del proceso de la división celular, alterando el desarrollo normal de los hongos y provocando su muerte. Impide la formación de hifas y micelio de <i>Rhizoctonia</i> .

**CATEGORÍA  
TOXICOLÓGICA  
(REGISTRO COFEPRIS):**

**Categoría Toxicológica: 5  
PRECAUCIÓN**

**“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS”**

**“INSTRUCCIONES DE USO”**

**“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”**

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Papa (SL)	Viruela o costra negra ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	8 a 10	Aplicación en aspersión en banda al momento de la siembra, asperjando los tubérculos y el fondo del surco antes de taparlos. Utilice como mínimo 750 L de agua para asegurar un buen cubrimiento.

( ) **Intervalo de seguridad:** Número de días entre la última aplicación y la recolección o cosecha del cultivo.

SL: Sin Límite

**Tiempo de reentrada a las zonas tratadas:** 12 horas.

### MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Diluya el producto en el agua, calibre el equipo de aplicación a fin de bañar perfectamente los tubérculos, los taludes y el fondo del surco, utilice suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento.

### CONTRAINDICACIONES

No aplicar con vientos fuertes o temperaturas superiores a 40°C

### FITOTOXICIDAD

No se recomienda mezclar **Monceren 250 SC** con ningún otro producto.

### INCOMPATIBILIDAD

**NO** mezclar **Monceren 250 SC** con productos de fuerte reacción alcalina. Se recomienda que para realizar mezclas, éstas sólo se lleven a cabo con productos autorizados por la autoridad competente en el cultivo indicado.

### MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”.

**NO. DE REGISTRO:** RSCO-FUNG-0354-304-064-023

**PRESENTACIÓN:** Envases de 4x5 L